

حلول مقترحة  
أذ سمير لخريسي

الإختبار الموحد المحلي للسنة الثالثة إعدادي  
الأسدس الأول - مادة الرياضيات  
يناير 2015

مؤسسة درعة الخاصة  
نيابة أنزكان آيت ملول

**تمرين 1 :**

$$A = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}} = \sqrt{3} \times \sqrt{\frac{15}{5}} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$$

1

$$B = 5\sqrt{12} + \sqrt{27} = 5 \times \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{9 \times 3} = 5 \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 10\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 13\sqrt{3}$$

2

$$D = \frac{(10^3)^4 \times 10^{-5}}{10^2} = \frac{10^{12} \times 10^{-5}}{10^2} = \frac{10^7}{10^2} = 10^5$$

3

$$(\sqrt{3} - 1)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 1 + 1^2 = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = 4 - 2\sqrt{3}$$

أ

$$\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{3 - 1} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = \frac{2(2 - \sqrt{3})}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

ب

4

**تمرين 2 :**

$$E = (x+2)(x+5) = x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$$

1

$$F = x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = (x+2)^2$$

أ

2

$$E + F = (x+2)(x+5) + (x+2)^2 = (x+2)[(x+5) + (x+2)] = (x+2)(2x+7)$$

ب

**تمرين 3 :**

أ) لدينا  $(\sqrt{44})^2 = 44$  و  $(3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45$  ، بما أن :  $45 > 44$  فإن :  $3\sqrt{5} > \sqrt{44}$

1

ب) بما أن :  $3\sqrt{5} > \sqrt{44}$  فإن :  $-3\sqrt{5} < -\sqrt{44}$

ب

$$\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 5 \leq b \leq 7 \end{cases}$$

لدينا :

$$\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 5 \leq b \leq 7 \end{cases}$$

لدينا :

$$\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 5 \leq b \leq 7 \end{cases}$$

لدينا :

$$\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ -7 \leq -b \leq -5 \end{cases}$$

إذن :

$$2 \times 5 \leq ab \leq 3 \times 7$$

إذن :

$$2 + 5 \leq a + b \leq 3 + 7$$

إذن :

$$2 + (-7) \leq a + (-b) \leq 3 + (-5)$$

إذن :

$$10 \leq ab \leq 21$$

بالتالي :

$$7 \leq a + b \leq 10$$

بالتالي :

$$-5 \leq a - b \leq -2$$

بالتالي :


2

$$(1+y)^2 - (1+2y) = 1 + 2y + y^2 - 1 - 2y = y^2$$

لدينا :  $(1+y)^2 \geq (1+2y)$  و بما مربع أي عدد حقيقي يكون دائما موجبا فإن :

4

**تمرين 4 :**



$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 4^2 + 3^2$$

$$AC^2 = 16 + 9$$

$$AC^2 = 25$$

لدينا في المثلث  $ABC$  القائم الزاوية في  $B$  حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة:

بالتالي:  $AC = 5 \text{ cm}$

لدينا :  $\frac{BE}{BC} = \frac{4,5}{3} = 1,5$  و  $\frac{BH}{BA} = \frac{6}{4} = 1,5$  إذن :  $\frac{BH}{BA} = \frac{BE}{BC}$

الآن لدينا في المثلث  $ABC$  :  $E \in (BC)$  و  $H \in (AB)$  و  $\frac{BH}{BA} = \frac{BE}{BC}$  و للنقط  $A$  و  $B$  و  $H$  نفس ترتيب

النقط  $C$  و  $B$  و  $E$  ، إذن حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية نستنتج أن :  $(EH) \parallel (AC)$

لدينا في المثلث  $ABC$  :  $E \in (BC)$  و  $H \in (AB)$  و  $(EH) \parallel (AC)$  ، إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة :

$$\frac{BH}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{HE}{AC} \quad \text{منه : } 1,5 = \frac{HE}{5} \quad \text{منه : } HE = 5 \times 1,5 = 7,5 \text{ cm}$$

يمكن استعمال مبرهنة فيثاغورس في هذا السؤال، لكن مبرهنة طاليس تعطي حسابات أقل لذلك فهي أفضل.

### تمرين 5 :

لدينا :  $AB^2 = 5^2 = 25$  و  $AC^2 = 12^2 = 144$  و  $BC^2 = 13^2 = 169$

بما أن :  $144 + 25 = 169$  فإن :  $AC^2 + AB^2 = BC^2$

إذن حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية نستنتج أن  $ABC$  مثلث قائم الزاوية في  $A$

منه :  $\sin(\hat{ABC}) = \frac{AC}{BC} = \frac{12}{13}$  و  $\cos(\hat{ABC}) = \frac{AB}{BC} = \frac{5}{13}$  و  $\tan(\hat{ABC}) = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{5}$

نعلم أن  $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$  إذن :  $(\sin x)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1$  منه :  $(\sin x)^2 + \frac{4}{9} = 1$

منه :  $(\sin x)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$  منه :  $\sin x = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$  منه :  $(\sin x)^2 = \frac{9}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

وبالتالي :  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

لدينا :  $\sin \alpha \times \cos \alpha \times \tan \alpha + \sin^2 \alpha = \sin \alpha \times \cos \alpha \times \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$